

Loro cabeza amarilla



Nombre científico: *Amazona oratrix*

Nombre Común: Loro cabeza amarilla

ORIGEN: MÉXICO, BELICE, GUATEMALA Y HONDURAS.

CARÁCTER: SOCIALES.

LONGEVIDAD: 50 A 60 AÑOS.

ALTURA: 35-38 CM.

Peso: hasta 500 gramos.

Características

El **Loro Cabeza Amarilla** (*Amazona oratrix*) tiene **cabeza** y **nuca** de color amarillo brillante; lados del **cuello** a veces con plumas verdes dispersas.

Partes superiores de color verde hierba con extremos de color verde más oscuro en algunas plumas; **coberteras supracaudales** más pálidas. **Coberteras alares** verdes, a veces con márgenes amarillos más pálidos en algunas plumas; borde delantero del **ala** y **área carpiana** con marcas rojas y / o amarillas variables. **Primarias** y **secundarias** verdes en la base (más esmeralda que las **coberteras**), azul en las puntas; base de las cinco **secundarias externas** de color rojo brillante, formando un **espéculo**. Por abajo las **alas** verdes. La **barbilla** es de color amarillo brillante, la **garganta** verde con sufusión azul variable y los márgenes oscuros en las plumas de algunas aves; **pecho** y **vientre** de color verde con sufusión amarillenta en algunas aves, sufusión azulada en otras; **muslos** con plumas amarillas en algunas aves. **Cola** de color verde con puntas de color verde amarillento y roja en la base de las **redes internas** de las **plumas laterales**. **Pico** de color gris cuerno; **anillo orbital** blanquecino; **iris** naranja; **patas** grises.

Ambos sexos son similares.

Inmaduro es en gran parte verde con poco o nada amarillo en la **cabeza** y sin rojo y amarillo en las **alas**.

Hábitat:

Los **Loro Cabeza Amarilla** frecuentan sabanas, bosques tropicales caducifolios (incluyendo claros), bosques densos de espinos, bosques pantanosos del **Pacífico**, bosque de inundación de hoja perenne, densos bosque de galerías, bosques con *Pinus caribea* (**Belice**) y terrenos cultivados con árboles, principalmente en tierras bajas por debajo de 500 metros.

Principalmente observados en parejas o en grandes grupos en dormideros comunales y en sus zonas favoritas de alimentación. Se acurrucan en crestas cubiertas de pinos en **Belice**, trasladándose a bosques húmedos cercanos para alimentarse. Al parecer, sólo se forman bandadas en *Tamaulipas*.



Alimentación:

Alimentos en la **dieta** del **Loro Cabeza Amarilla** incluyen **brotos**, **hojas** nuevas, **frutos** de *palma*, **semillas** de *Acacia*, frutos.

Pueden causar daños en cultivos, incluyendo maíz, mango y plátanos verdes.

Programa de medicina preventiva:

Los ejemplares se desparasitan cada 4 o 6 meses según el medio y la alimentación que reciban. No está indicada la vacunación en psitácidos, pese a la existencia de enfermedades virales exclusivas de estas especies.

En cautividad:

Los **Loro Cabeza Amarilla** son **populares** en los mercados nacionales. Protegidas por **CITES Apéndice I** (Especies que están en peligro de extinción. **Prohibido el comercio internacional** de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales).

En **México** está enlistado como en peligro de extinción tanto en la *NOM-059-SEMARNAT-2001*, como en la *NOM-059-SEMARNAT-2010*, y por el *Artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre* está prohibida la extracción de especímenes del medio, la comercialización, tenencia, importación, exportación, aprovechamiento de ninguna de sus partes. Son hasta 9 años de cárcel y multas muy elevadas a quienes son sorprendidos por la *Profepa* con ejemplares de esta especie en su posesión y no cuentan con los papeles que acrediten su legal procedencia.

Hay que evitar en todos los casos comprar ésta o cualquiera de las **especies protegidas** por los diferentes Apéndices de la **CITES**.

